

Activator

Vandaag is er bij jou een activator geplaatst. Deze beugel wordt ook wel een functioneel apparaat of een blokbeugel genoemd.

Gevoeligheid

Na het plaatsen of het bijstellen van de beugel kunnen je tanden en kiezen gevoelig zijn. Ook kan de beugel in het begin je wangen, tong en mondbodem irriteren. Deze klachten gaan meestal vanzelf over. Wanneer de klachten na een paar dagen niet minder worden, of je krijgt zoveel last dat je de beugel niet kan dragen, neem dan contact op met de praktijk.

In het begin is praten lastig met de beugel. Door veel te oefenen gaat dit binnen een paar dagen beter.

Wanneer dragen?

De beste werking van je beugel is er door de beugel heel goed te dragen! Je moet de activator 24 uur per dag dragen, tenzij de orthodontist het anders heeft aangegeven. De beugel mag je uit doen tijdens het eten, drinken, tandenpoetsen en tijdens het sporten. Speel niet met de beugel, dit kan namelijk breuk geven in de metalen onderdelen.

In de activator zit een chip die de draagtijd van jouw beugel registreert. Bij de controle kunnen deze gegevens worden uitgelezen door de computer.

Eten

Tijdens eten en drinken mag de beugel even uit.

Eet zo min mogelijk suiker, snoep en zoetheid, omdat het slecht is voor je gezondheid en gaatjes in de tanden kunnen veroorzaken.

Tandenpoetsen

Voor het poetsen doe je de beugel uit. Spoel de beugel af onder de kraan en poets de beugel met een harde tandenborstel met water of groene zeep. Wanneer de beugel door tandsteen ernstig vervuild is, kan de beugel gedurende ½ uur in de natuur zijn aangelengd met koud water worden gelegd.

Tandenpoetsen doe je drie keer per dag: 's ochtends, 's middags en 's avonds. Neem dus een tandenborstel mee naar school. Controleer in de spiegel of alles goed schoon is. Na het poetsen moet je de beugel direct terugplaatsen in de mond. Poets altijd de tanden alvorens je in de behandelstoel gaat zitten voor de controle. In de praktijk is een speciale poetshoek aanwezig waar je de tanden kunt poetsen. Elke keer als je voor behandeling komt controleren we of de tanden en het tandvlees goed schoon zijn. Je dient zelf zorg te dragen voor een tandenborstel.

Wanneer drie keer wordt opgemerkt dat je toch niet goed gepoetst hebt, wordt de behandeling gestaakt.

Beugel kapot?

Gaat er iets kapot aan de beugel neem dan telefonisch contact op met de praktijk tijdens kantooruren. Vertel aan de telefoon duidelijk wat er kapot is en waar. Zo kunnen we bepalen of het direct moet worden hersteld of dat het kan wachten. Ook al is er op de dag van de controle iets kapot, MELD dit altijd VOORAF. Reparaties kosten namelijk extra tijd. Zowel stoeltijd, gedurende de controle, als ook kostbare behandelingsperiode: door kapotte apparatuur kan een goede vooruitgang van de behandeling geblokkeerd worden, waardoor het niet lukt binnen de afgesproken behandelingsperiode een goed resultaat te bereiken.

Wanneer een beugel kapot is, nemen wij de reparatiekosten de eerste keer voor onze rekening. Iedere volgende reparatie van de beugel brengen wij in rekening.

In de meeste gevallen zal de activator opgestuurd moeten worden voor reparatie. Hiervoor zijn de gipsmodellen nodig die je mee naar huis hebt gekregen. **Breng dus altijd de activator en de gipsmodellen mee, indien de activator gerepareerd moet worden.**